

RESUMEN MENSUAL DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UVI) Y LA CAPA DE OZONO

ABRIL 2026

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS
SERVICIO DE REDES ESPECIALES Y VIGILANCIA ATMOSFERICA
CENTRO RADIOMETRICO NACIONAL


11/05/2026

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

La distribución de la radiación ultravioleta no sigue completamente el modelo de distribución de la radiación solar global, siendo más dependiente todavía de la altura sobre el nivel del mar y menos dependiente de la nubosidad, al tener un alto componente de radiación difusa. En general los valores más altos se observan en Canarias, por su latitud tan meridional, en las dos mesetas, por su mayor altura sobre el nivel del mar, y en el sur de Andalucía (sobre todo en otoño e invierno) por su ubicación con respecto al resto de estaciones peninsulares. Por el contrario los valores más bajos se registran normalmente en la zona norte del Mediterráneo, Cantábrico y Galicia.


En las gráficas siguientes se muestra, en la primera, la distribución media diaria de la radiación ultravioleta eritemática (UVER) según la escala eritemática de Diffey; y en la segunda, los valores máximos del índice de radiación ultravioleta (UVI) registrados en los principales puntos de la red de medidas de radiación ultravioleta.

VALORES MEDIO DIARIOS DE RADIACIÓN UV Eritemática EN DISTINTAS ESTACIONES DE LA RED ABRIL/2026(J/m²)



El máximo UVI registrado en abril (datos minutales) fue de 13.5 en Izaña. En la Península el UVI máximo fue 9,0 en Navacerrada. La media de las máximas en las estaciones de la Península y Baleares de este mes ha sido de 8,0.

**VALORES MÁXIMOS DEL INDICE UVI
ABRIL/2026**




ESTACIÓN DEL CENTRO RADIOMÉTRICO NACIONAL (MADRID)

La media mensual del UVI máximo diario en abril ha sido superior a la media de la serie histórica. Así, la media en Madrid del UVI máximo diario ponderado (máxima de valores medios semihorarios) ha sido de 6,3.

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA CENTRO RADIOMÉTRICO NACIONAL

MEDIA DIARIA MENSUAL DE UVI MAX DIARIO ESTACION : MADRID (AEMET - CRN - Ciudad universitaria)


	2025					2026						
	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.
Año Agrícola 2025-26	6,2	3,9	2,0	1,1	1,2	2,6	4,1	6,3				
MEDIA 99-24	6,0	3,7	2,0	1,3	1,5	2,6	4,2	6,1	7,6	8,6	9,0	8,0
MAXIMA 99-24	6,6	4,5	2,6	1,6	1,9	3,1	5,3	7,3	8,5	9,5	9,5	8,6
MINIMA 99-24	5,6	3,1	1,6	1,0	1,3	2,0	3,0	5,2	6,4	7,7	8,3	7,3



CAPA DE OZONO

En el siguiente gráfico se muestran los valores diarios de ozono total en columna para todas las estaciones de la Red de Espectrofotómetros Brewer con los valores medios, máximos y mínimos registrados en cada una de ellas. Los valores extremos se han registrado en A Coruña, con un máximo de 416 Unidades Dobson (UD), y en Izaña, con un mínimo de 297 UD.


DATOS MENSUALES DE OZONO EN COLUMNA ABRIL 2026



© Agencia Estatal de Meteorología

NOTA: La estación de El Arenosillo no ha sido graficada debido a la ausencia de datos diarios durante ocho días, lo que convierte las magnitudes estadísticas en no significativas.

ESTACIÓN DEL CENTRO RADIOMÉTRICO NACIONAL (MADRID)




El contenido medio mensual de ozono total en columna, medido en la estación del Centro Radiométrico Nacional (CRN) en abril, fue de 347 Unidades Dobson. Este valor ha sido inferior al valor medio de la serie 1996-2024 para este mes (356 U.D).

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
CENTRO RADIOMÉTRICO NACIONAL

MEDIA DIARIA MENSUAL DE OZONO ESTACION : MADRID (AEMET-CRN- Ciudad universitaria)

UNIDADES: Unidades Dobson


	2025					2026							
	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	
Año agrícola 2025-26	297	283	293	330	359	339	356	347					
MEDIA 96-24	301	287	292	300	322	333	344	356	347	328	315	307	
MAXIMA 96-24	316	305	314	319	353	365	389	391	374	357	327	319	
MINIMA 96-24	284	266	275	268	284	295	311	323	318	310	293	295	




FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología

En los siguientes mapas se puede ver la distribución media de la capa de ozono en el Hemisferio Norte durante el mes de abril y la diferencia respecto a la media del período 1978-1988 estimada a partir de datos de satélite (instrumento TOMS, Total Ozone Mapping Spectrometer) para el mismo mes. En Europa, en general, se han dado valores en torno a la media o inferiores a ésta.


Mean total ozone (DU), 2026/04/01-2026/04/30



Mean deviation (%), 2026/04/01-2026/04/30



En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de los valores diarios de ozono en columna en las estaciones de AEMET de la Península durante el año agrícola 2025-26, comparados con la media histórica diaria de Madrid. Se observan las constantes oscilaciones de los valores en los meses de invierno debido a la entrada de numerosos frentes y masas de aire cargados de ozono, mientras que en primavera y otoño los valores son más similares a los normales y con menos oscilaciones.



Se recuerda que en la página web de la Agencia (en los apartados de “Observación” y “Predicción”) se proporciona, tanto información diaria sobre el índice ultravioleta (UVI) registrado el día anterior en las diferentes estaciones de la Red, como el índice previsto para los próximos 5 días. También en el apartado de “Ozono” se dan los valores diarios de ozono en columna obtenidos de los diferentes espectrofotómetros Brewer de la Red.