

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Febrero de 2013 en Extremadura

La precipitación en el mes de febrero ha sido superior a la media en varias de las comarcas de la Región, concretamente en Vegas Altas y Bajas, Tierra de Barros, La Serena, Sierra de Jerez, Zafra y La Campiña. En la mayor parte de Extremadura se han superado los 40 litros/m².

En términos globales, haciendo la media para todos los puntos de la Región, podemos decir que la precipitación media, para toda Extremadura, durante el pasado mes de febrero, ha sido de 63 litros/m², frente a los 73 litros/m² que refleja la media histórica, es decir, que hemos registrado un déficit medio de -10 litros/m², o una anomalía negativa del 14% respecto del valor medio, o esperado.

En cuanto a los valores termométricos registrados en el mes de febrero, podemos observar que tanto las temperaturas máximas medias como las mínimas han estado algo más bajas de la media. Los valores medios observados han oscilado entre 11 y 12 °C, para las máximas medias y entre 3 y 4 °C las mínimas medias mensuales.

En términos globales, haciendo la media para todos los puntos de la Región, se ha estimado que al temperatura media ha sido de 7.2 °C, frente a los 8.5 °C que refleja la media histórica.

Globalmente para toda Extremadura podemos caracterizar el mes como húmedo en cuanto a las precipitaciones, y normal respecto a las temperaturas.

PRECIPITACIONES MENSUALES (litros/m²)

Estación	Precipitación	Porcentaje	Carácter pluviométrico
BADAJOS	34,4	89 %	normal
CÁCERES	83,1	172 %	muy húmedo
MÉRIDA	61,2	160 %	muy húmedo
DON BENITO	43,2	124 %	húmedo
ZAFRA	72,2	106 %	húmedo

PRECIPITACIONES AÑO AGRÍCOLA (desde septiembre hasta el mes actual) (litros/m²):

Estación	Precipitación	Porcentaje	Carácter pluviométrico
BADAJOS	339,4	106%	húmedo
CÁCERES	447,2	119%	húmedo
MÉRIDA	348,6	105%	húmedo
DON BENITO	384,4	133%	muy húmedo
ZAFRA	491,6	129%	húmedo

Porcentaje: Cociente entre la precipitación media y la normal para del periodo de referencia, expresada en %.

Carácter térmico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1971-2000. "extremadamente" seco o húmedo cuando la precipitación este fuera del rango en dicho periodo.



AEMET

TEMPERATURAS (°C):

Estación	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
BADAJOS	9,3	-0,4	cálido
CÁCERES	8,2	-1,1	normal
MÉRIDA	8,9	-1,5	normal
DON BENITO	8,7	-0,8	cálido
ZAFRA	7,4	-1,6	normal

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia, expresada en °C

Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1971-2000. "extremadamente" frío o cálido cuando la temperatura este fuera del rango en dicho periodo.

Notas:

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y está sujetos a una posterior validación.
2. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.
3. Fecha de obtención de los datos: 8 de marzo de 2013