

Resumen climatológico del mes de Marzo de 2016 en la red de observatorios meteorológicos principales de la Delegación Territorial en el País Vasco de AEMET

	Igueldo	Hondarribia	Loiu	Foronda	Aquarium
Tª media	9.1	10.9	10.0	6.9	12.2
Tª mediaserie	10.2	11.1	11.1	7.9	12.3
Clasificación termométrica	Frío	Normal	Frío	Frío	Normal
Tª Máximabs-día	23.5 - 26	25.8 - 26	24.3 - 26	20.8 - 30	13.1 - 31
Tª mínimabs-día	2.6 - 8	2.6 - 15	2.3 - 15	-2.5 - 15	11.5 - 1
Prec-total	204.7	267.9	214.5	137.4	
Prec-serie	112.2	139.6	95.3	70.2	
Clasificación pluviométrica	Muy húmedo	Muy húmedo	Muy húmedo	Muy húmedo	
Precmáxima-día	34.1 - 5	39.0 - 4	42.0 - 5	31.2 - 9	
Viento	S	SW	N	N	
RachaMáxima-día	96 - 320° - 9	68 - 220° - 2	76 - 300° - 9	80 - 230° - 28	
Días de pcp. apreciable	23	22	21	20	
Días de pcp. inapreciable	1	1	2	2	
Días escarcha	0	0	0	2	
Días nieve	0	0	0	2	
Días niebla	7	0	1	1	
Días granizo	3	3	3	0	
Días tormenta	1	3	1	3	
Horas sol	108	115	61	108	
Horas sol-serie	141	138	129	141	

Notas: Los datos empleados para elaborar este resumen climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

Este mes han predominado las bajas presiones.

LESO el cuarto mes de marzo más lluvioso de la serie climatológica.

LEBB el segundo mes de marzo más lluvioso de la serie climatológica.

correo electrónico/ helbide elektronikoa

usuariospva@aemet.es

Plaza Pío XII, 2ª planta
20071 Donostia-San Sebastián
TEL.: 943 392 000
FAX.: 943 401 413

Presentamos en la tabla un resumen de la evolución del clima durante el mes, en la red de observatorios meteorológicos principales pertenecientes a la Delegación de AEMET en el País Vasco. La lectura de las filas de la tabla es la siguiente:

- T^a media. Es la temperatura media mensual medida en grados centígrados.
- T^a mediaserie. Es la media de las temperaturas medias mensuales, medida en grados centígrados, de la serie climatológica de temperaturas del observatorio.
- Clasificación termométrica. Clasificación climatológica respecto a la serie climatológica.
- T^a Máximabs-día. Es la temperatura máxima absoluta registrada en el mes medida en grados centígrados y el día en el que se midió.
- T^a mínimabs-día. Es la temperatura mínima absoluta registrada en el mes medida en grados centígrados y el día en el que se midió.
- Prec-total. Es la precipitación total recogida en el mes, medida en milímetros de precipitación durante el día pluviométrico.
- Prec-serie. Es la media de las precipitaciones totales mensuales de toda la serie climatológica de precipitación del observatorio, medida en milímetros de precipitación durante el día pluviométrico.
- Clasificación pluviométrica. Clasificación climatológica respecto a la serie climatológica.
- Precmáxim-día. Es la precipitación máxima en un día, registrada en el mes, medida en milímetros de precipitación y el día pluviométrico en el que se midió.
- Viento. Dirección del viento más frecuente en el mes.
- RachaMáxima-día. Velocidad de la racha máxima en Km/h medida en el mes, dirección de la racha y día en el que se registró.
- Días de precipitación apreciable. Número de días que hubo precipitaciones mayores o iguales a 0.1 mm. durante el mes.
- Días de precipitación inapreciable. Número de días que hubo precipitaciones menores a 0.1 mm. durante el mes.
- Díashelada. Número de días de helada registrados durante el mes.
- Díasnieve. Número de días de nieve registrados durante el mes.
- Díasniebla. Número de días con niebla registrados durante el mes.
- Días granizo. Número de días con granizo registrados durante el mes.
- Días tormenta. Número de días con tormenta registrados durante el mes.
- Horas sol. Número de horas de sol despejado de nubes.
- Horas sol-serie. Media del número de horas mensuales de sol despejado de toda la serie climatológica de insolación del observatorio.

correo electrónico/ helbide elektronikoa

usuariospva@aemet.es

Plaza Pío XII, 2^a planta
20071 Donostia-San Sebastián
TEL.: 943 392 000
FAX.: 943 401 413

El día pluviométrico se diferencia del día civil en que comienza a las 07 horas TMG del día civil y termina a las 07 TMG del día siguiente.

Las longitudes de las series climatológicas de los distintos observatorios meteorológicos es la siguiente:

- Observatorio de Igueldo: 1928-2015
- Observatorio del aeropuerto de Loiu: 1947-2015
- Observatorio de aeropuerto de Hondarribia: 1955-2015
- Serie de Vitoria, resultado de la fusión de la serie del aeródromo de Vitoria 1945-1980 con la serie del aeropuerto de Foronda 1980-2015
- Serie del Acuarium: 1947-2015

Las clasificaciones climatológicas mensuales respecto a la serie climatológica de las precipitaciones y temperaturas son: Normal, seco-húmedo, cálido-frío, muy seco-muy húmedo, muy cálido- muy frío, EC= extremadamente cálido, EF= extremadamente frío, EH= extremadamente húmedo y ES= extremadamente seco.

Cuando una clasificación se considera “extremada” queremos indicar que se sobrepasa el valor máximo histórico registrado en la serie climatológica. Si es la primera vez que se alcanza el extremo será una “Efemérides”.