

Resumen climatológico del mes de abril del 2005 en la red de observatorios meteorológicos principales del CMT en el País Vasco

	Igueldo	Hondarribia	Sondica	Foronda
Tª media	12.1	13.5	13.5	10.6
Tª mediaserie	11.2	12.4	12.0	9.4
Clasificación termométrica	Cálido	Cálido	Muy cálido	Muy cálido
Tª Máximabs-día	29.4 30	32.4 30	30.1 30	28.2 29
Tª mínimabs-día	3.1 9	2.6 9	4.5 9	0.6 8-9-13
Prec-total	201.8	222.9	188.0	99.0
Prec-serie	133.3	159.5	113.7	79.0
Clasificación pluviométrica	Muy húmedo	Húmedo	Muy húmedo	Húmedo
Precmáxima-día	42.5 - 15	39.7 - 15	32.2 - 20	15.3 - 8
Viento	NNW	NW	W	NW
RachaMáxima-día	91 – 170° 1	67- 270° 18	96 – 290° 22	62 – 320° 18
Días escarcha	0	0	0	1
Días nieve	0	0	0	2
Días niebla	11	0	3	3
Días granizo	3	3	4	0
Días tormenta	4	6	4	5
Horas sol	151	149	121	164
Horas sol-serie	144	149	134	151

Presentamos en la tabla un resumen de la evolución del clima durante el mes, en la red de observatorios meteorológicos principales pertenecientes al CMT en el País Vasco. La lectura de las filas de la tabla es la siguiente:

- T^a media. Es la temperatura media mensual medida en grados centígrados.
- T^a mediaserie. Es la media de las temperaturas medias mensuales, medida en grados centígrados, de la serie climatológica de temperaturas del observatorio.
- Clasificación termométrica. Clasificación climatológica respecto a la serie climatológica.
- T^a Máximabs-día. Es la temperatura máxima absoluta registrada en el mes medida en grados centígrados y el día en el que se midió.
- T^a mínimabs-día. Es la temperatura mínima absoluta registrada en el mes medida en grados centígrados y el día en el que se midió.
- Prec-total. Es la precipitación total recogida en el mes, medida en milímetros de precipitación durante el día pluviométrico.
- Prec-serie. Es la media de las precipitaciones totales mensuales de toda la serie climatológica de precipitación del observatorio, medida en milímetros de precipitación durante el día pluviométrico.
- Clasificación pluviométrica. Clasificación climatológica respecto a la serie climatológica.
- Precmáxim-día. Es la precipitación máxima en un día, registrada en el mes, medida en milímetros de precipitación y el día pluviométrico en el que se midió.
- Viento. Dirección del viento más frecuente en el mes.
- RachaMáxima-día. Velocidad de la racha máxima en Km/h medida en el mes, dirección de la racha y día en el que se registró.
- Díashelada. Número de días de helada registrados durante el mes.
- Díasnieve. Número de días de nieve registrados durante el mes.
- Díasniebla. Número de días con niebla registrados durante el mes.
- Díasgranizo. Número de días con granizo registrados durante el mes.
- Díastormenta. Número de días con tormenta registrados durante el mes.
- Horas sol. Número de horas de sol despejado de nubes.
- Horas sol-serie. Media del número de horas mensuales de sol despejado de toda la serie climatológica de insolación del observatorio.

El día pluviométrico se diferencia del día civil en que comienza a las 07 horas TMG del día civil y termina a las 07 TMG del día siguiente.

Las longitudes de las series climatológicas de los distintos observatorios meteorológicos es la siguiente:

- Observatorio de Igueldo: 1928-2004
- Observatorio del aeropuerto de Sondica: 1947-2004
- Observatorio de aeropuerto de Hondarribia: 1955-2004
- Serie de Vitoria, resultado de la fusión de la serie del aeródromo de Vitoria 1945-1980 con la serie del aeropuerto de Foronda 1980-2004