

EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS CICLONES CON CARACTERÍSTICAS TROPICALES EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA: EFECTOS DE UTILIZAR MODELOS DE ALTA RESOLUCIÓN O CON ACOPLAMIENTO ATMÓSFERA-OCÉANO

Jesús GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ⁽¹⁾, Juan Jesús GONZÁLEZ-ALEMÁN⁽¹⁾ y
Miguel Ángel GAERTNER^(1,2)

(1) Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM). Universidad de Castilla-La Mancha,

(2) Facultad de Ciencias del Medio Ambiente y Bioquímica. Universidad de
Castilla-La Mancha.

**jesus.gutierrez1@alu.uclm.es juanjesus.gonzalez@uclm.es
miguel.gaertner@uclm.es**

RESUMEN

Los ciclones con características tropicales son poco frecuentes en la Cuenca Mediterránea debido a que las condiciones atmosféricas y oceánicas son poco favorables para su desarrollo y mantenimiento. En el Mar Mediterráneo, este tipo de ciclones son llamados Medicanes (“Mediterranean Hurricanes”). El motivo principal para realizar este trabajo es el estudio de las proyecciones de futuro para este tipo de ciclones en la Cuenca Mediterránea mediante la utilización de modelos regionales de clima, analizando los efectos del acoplamiento océano-atmósfera y la alta resolución. El análisis ha sido realizado para el escenario de Clima Futuro RCP85 hasta 2100. Las simulaciones fueron hechas en el marco de trabajo de los programas europeos MedCORDEX y EuroCORDEX. El análisis de detección de Medicanes incluye el método de Picornell, (Picornell et al., 2001) para la detección de ciclones, adaptado a la detección de ciclones mesoescalares, y el empleo del método de Hart (Hart., 2003) para detectar ciclones que presenten estructura y características tropicales. Los primeros resultados obtenidos para dicho estudio, muestran una gran frecuencia e intensidad de Medicanes en modelos de alta resolución, en consonancia con resultados anteriores (Akhtar et al 2014). Al comparar los modelos acoplados y los no acoplados se detecta que en ambos se observa un descenso futuro del número de Medicanes, así como una intensidad mayor de éstos a finales del periodo de estudio, es decir se observan medicanes con características tropicales más marcadas y velocidades máximas de viento más altas.

Palabras clave: Medicanes, acoplamiento, modelos, escenarios, RCP85.

ABSTRACT

Cyclones with tropical characteristics are rare in the Mediterranean Sea, because atmospheric and oceanic conditions are unfavourable for their development and maintenance. In the Mediterranean Sea, this type of cyclones are called Medicanes (“Mediterranean Hurricanes”). The main aim of this work is the study of future projections for these type of cyclones in the Mediterranean basin with climate regional models, analysing the effect of the atmosphere-ocean coupling and high resolution.

The analysis is realized for the future climate scenario RCP85 until 2100. The simulations were done in the framework of European projects MedCORDEX y EuroCORDEX. The analysis procedure includes the detection of cyclones with a method adapted for mesoscale cyclones (Picornell et al., 2001) and the application of Hart method (Hart., 2003) for analysing the structure of the cyclones and detecting tropical characteristic. The first results of this study show a greater frequency and intensity of Medicane in higher resolution models compared to lower resolution ones, in agreement with previous results (Akhtar et al 2014). The comparison of an air-sea coupled simulation with an uncoupled simulation shows interesting results: for present climate conditions, a higher medicane frequency is found in the uncoupled simulation, but during the last decades of present century more medicanes are detected in the coupled run. The projected future medicane decrease is therefore much smaller in the coupled run, pointing to complex and time-varying effects of air-sea coupling on this type of extreme phenomena.

Key words: Medicanes, coupling, models, scenarios, RPC85.

1. INTRODUCCIÓN

Los ciclones con características tropicales son poco frecuentes en la Cuenca Mediterránea debido a que las condiciones atmosféricas y oceánicas son poco favorables para su desarrollo y mantenimiento. En el Mar Mediterráneo, este tipo de ciclones son llamados Medicane ("Mediterranean Hurricanes"). En los últimos años, se han observado Medicane con una fuerte intensidad como el ocurrido en Noviembre de 2011 (Miglietta et al., 2013).

Los Medicane presentan características tropicales como son la presencia de Núcleo Cálido, simetría e intensa convección. Estos ciclones están asociados a fenómenos extremos como son fuertes vientos, precipitaciones torrenciales y fuerte oleaje, afectando sobre todo a zonas costeras




Fig. 1: Representación de las condiciones de cizalla del viento en altura que permiten el desarrollo de Medicane (fig. 1a) y las que no son favorables (fig. 1b).

Este tipo de Ciclones tienen origen en Bajas presiones Extratropicales que llevan asociadas una potente Vaguada. Esta vaguada da lugar a una baja presión secundaria que al pasar a zonas del Mar Mediterráneo pierde sus características baroclínicas y sufre un proceso de transición tropical.

Para que los procesos de transición tropical tengan lugar es necesario que la cizalla del viento en altura sea débil (fig. 1.), si esto ocurre el núcleo de la baja en altura y en superficie quedan alienados, lo que favorece fuerte convección, que además da lugar a la liberación de calor latente en el centro del ciclón lo que propicia la formación de su núcleo cálido. Tras esto el ciclón comience a perder la estructura frontal y su estructura asimétrica.

2. MÉTODOS

Los datos utilizados en el análisis son datos proporcionados por simulaciones de Modelos regionales de Clima, para escenarios de Clima Futuro RCP85 hasta 2100, utilizando diferentes resoluciones horizontales así como modelos acoplados y no acoplados. (Tabla 1). Las simulaciones fueron hechas en el marco de trabajo de los programas europeos MedCORDEX y EuroCORDEX

MODELO RCM	Acoplamiento (Océano-Tierra).	Resolución horizontal.
AWI-REMO	Acoplado (C)	50 km (LR)
	No acoplado (U)	50 km (LR)
	Acoplado (C)	25 km (HR)
	No acoplado (U)	25km (HR)
CNRM-ALADIN52	No acoplado (U)	50 km (LR)
	No acoplado (U)	12,5 km (HR)
CSC-REMO	No acoplado (U)	50 km (LR)
SMHI-RCA4	No acoplado (U)	50 km (LR)

Tabla 1: Modelos utilizados para realizar este trabajo.

El análisis de detección de Medicanes incluye el método de Picornell, (Picornell et al., 2001) para la detección de ciclones, adaptado a la detección de ciclones mesoscales, y el empleo del método de Hart (Hart., 2003) para detectar ciclones que presenten estructura y características tropicales.

En este método se utilizan tres variables fundamentales para caracterizar la estructura térmica de cualquier ciclón. El parámetro de simetría (B), nos permite dar una idea de si el sistema presenta características frontales o no. Para este estudio se determina que debe de ser mayor de cero ($B > 0$). Tras esto se mira también el viento térmico en la alta (V_T^U) y baja (V_T^L) troposfera, esto nos da una idea de la estructura térmica vertical en el centro del ciclón. En este caso estos valores tienen que ser superiores a cero para identificar al ciclón




Fig. 2: La subfigura a muestra un mapa de diferencia de geopotencial (900-300 hPa) en sombreado y en contornos la presión en hPa. Mientras que la subfigura b corresponde con los diagramas de fase de vida de un ciclón simulado con AWI-REMO-C-HR.

Por último se aplica un umbral de velocidad máxima del viento en el ciclón de 16,5 m/s en el caso de modelos de baja resolución horizontal y de 17,5 m/s en modelos de alta resolución horizontal.

3. RESULTADOS

En este apartado se muestran los resultados conseguidos tras realizar un estudio estadístico de los medicanes obtenidos.

3.1. Frecuencia decadal de Medicanes

En la fig. 3 se puede ver que la frecuencia decadal de Medicanes es superior en los Modelos de alta resolución debido a que estos presentan una mayor sensibilidad a detectar este tipo de fenómenos de mesoscala.




Fig. 3: Frecuencia decadal de Medicanes para modelos de alta y baja Resolución desde 1950-2100.

La tendencia de Medicanes desde 1950-2100 muestra una inclinación a descender a finales de Siglo, este descenso es más pronunciado en los modelos de Alta resolución, donde la tendencia es significativa al 95%.

Otro parte de este estudio decadal consistió en tomar los medicanes que presentan un ciclo de vida superior a 12 horas.




Fig. 4; Frecuencia decadal de Medicanes para modelos de alta y baja Resolución desde 1950-2100 para Medicanes con un ciclo de vida igual o superior a 12 horas.

Los resultados obtenidos muestran que en modelos de HR se observa una tendencia a disminuir su frecuencia hasta principios del S.XXI, a partir de entonces se observa una tendencia a mantenerse o a aumentar de forma ligera la frecuencia de dichos ciclones.

3.2. Frecuencia Mensual de Medicanes




Fig. 5: Frecuencia mensual de Medicanes para modelos de alta Resolución.

Los medicanes no presentan una homogeneidad de aparición a lo largo del año, esto da lugar a un ciclo mensual de Medicanes que según se puede observar en la fig. 5,

presenta un máximo de frecuencia durante los meses de invierno (sobre todo en Enero) mientras que durante los meses de verano se observa un mínimo estacionario de frecuencia.

Si tenemos en cuenta el resultado del apartado 3.1, de cara al futuro se observa un descenso del número de Medicanes. Como se muestra en la fig. 6, este descenso también afecta la frecuencia mensual.




Fig. 6: Frecuencia mensual de Medicanes en modelos de alta y baja resolución para clima pasado y futuro.

A grandes rasgos, se puede ver que la frecuencia de Medicanes desciende en todos los meses de cara a finales del S.XXI, pero este descenso es más pronunciado durante los meses de invierno. Haciendo un análisis global por estaciones, se confirma este descenso como se puede ver en la Tabla 2.

Estaciones	Modelos HR		Variación HR	Modelos LR		Variación HR
	1950-2005	2006-2100		1950-2005	2006-2100	
1 Invierno	1,77	1,02	-0,75	0,75	0,39	-0,36
2 Primavera	0,54	0,32	-0,22	0,13	0,12	-0,02
3 Verano	0,19	0,12	-0,07	0,08	0,06	-0,02
4 Otoño	1,29	0,87	-0,42	0,48	0,40	-0,08

Tabla. 2: frecuencia de Medicanes por año en cada una de las estaciones y el porcentaje de variación entre clima pasado y clima futuro.

A finales de siglo es posible que la frecuencia de aparición de Medicanes durante invierno y otoño tienda a igualarse en vista a los resultados obtenidos.

3.3. Intensidad de Medicanes

A la hora de medir la intensidad de estos ciclones se ha utilizado la variable de velocidad máxima del viento (m/s) en el Ciclón. Los resultados obtenidos muestran que los modelos de alta resolución muestran una mayor intensidad de viento que los modelos simulados en baja resolución, como se puede ver en fig. 7.




Fig. 7: Boxplots de velocidad máxima del viento (m/s) para modelos de alta (HR) y baja (LR) resolución.

Al realizar el estudio de la velocidad máxima de viento por cincuentenas para los modelos de alta resolución (fig. 8), se observa que no hay un comportamiento común claro de la velocidad máxima del viento en los diferentes modelos. AWI-REMO-C y CNRM muestran un ligero descenso o mantenimiento de la intensidad de Medicanes de cara a finales de este siglo, mientras que AWI-REMO-U, muestra una tendencia a aumentar la intensidad de estos ciclones.




Fig 8: Boxplots de velocidad máxima del viento (m/s) para modelos de alta resolución horizontal, divididos en períodos de cincuenta años para estudiar su evolución futura.

Por tanto no se observa un patrón claro de comportamiento futuro de la intensidad de viento, sino que en este aspecto la incertidumbre es bastante elevada.

3.4 Diferencias entre los pares del Modelo AWI-REMO con acoplamiento atmósfera-océano y sin acoplamiento.

Uno de los principales objetivos de este trabajo es el estudio del efecto de utilizar modelos con acoplamiento atmósfera-océano y aquellos que no lo tienen (Gaertner et al., 2016). Para ello se ha utilizado el Modelo regional Climático AWI-REMO, el cual tiene los dos pares de simulaciones.

Los resultados obtenidos muestran que hay diferencias entre ambas simulaciones, y que eso afecta a cuestiones anteriormente estudiadas como son la frecuencia decadal o la intensidad de los mismos.




Fig. 9: Frecuencia decadal de Medicanes para el Modelo AWI-REMO de alta resolución horizontal tanto para la simulación acoplada (C) como para la simulación sin acoplamiento (U) desde 1950-2100.

En cuanto a la frecuencia décadas (fig. 9.) se observa que la disminución de Medicanes de cara a finales de siglo es más notable en la simulación acoplada (AWI-REMO-C-HR) que en la simulación no acoplada (AWI-REMO-U-HR), donde el descenso es menos acusado.




Fig. 10: Boxplots de velocidad máxima del viento (m/s) para el Modelo AWI-REMO de alta resolución horizontal tanto para la simulación acoplada (C) como para la simulación sin acoplamiento (U), divididos en períodos de cincuenta años.

Por otro lado, el estudio de la intensidad máxima de viento para los dos pares de simulaciones, ofrece información diferente (fig. 10.) El Modelo AWI-REMO-U-HR muestra un ligero aumento de la intensidad de los mismos mientras que la simulación acoplada (AWI-REMO-C-HR) aprecia una ligera disminución de la Intensidad de los mismos. Es decir existen diferencias a simple vista de utilizar modelos acoplados a utilizar no acoplados.

4. DISCUSIÓN

Emplear modelos climáticos de alta resolución horizontal (HR), ayuda a tener mayor sensibilidad e intentar detectar un número de medicanes más acorde con los datos observados que si utilizamos modelos de baja resolución. Estos modelos ven que hay una tendencia general a descender la frecuencia de Medicanes en las próximas décadas, aun así se observa una gran variabilidad decadal, que deberá ser analizada en trabajos siguientes.

En cuanto a la intensidad, con los resultados obtenidos no se pueden sacar conclusiones absolutas, debido a que no todos los modelos muestran resultados iguales.

Uno de los grandes objetivos de este trabajo era también analizar las diferencias de utilizar modelos acoplados y no acoplados. Se puede decir que los modelos acoplados reproducen de manera más fiel a la realidad el clima pasado. Por tanto esto nos empuja a pensar que debido a que simulan mejor la relación entre las condiciones atmosféricas y oceánicas, es posible que en el futuro, el empleo de estos modelos nos permita un mejor análisis de estos ciclones.

REFERENCIAS

- Akhtar, N., Brauch, J., Dobler, A., Béranger, K., Ahrens, B., 2014. Medicane in an ocean-atmosphere coupled regional climate model. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 14, 2189–2201, 2014. doi:10.5194/nhess-14-2189-2014
- Carrión, D.S, Homar V., Jans, A., Romero R., Picornell, M.A., 2017. Tropicalizations process of the 7 November 2014 Mediterranean cyclone: Numerical sensitivity study. *Atmospheric Research* 197 (2017), 300-312.
- Cavicchia, L., Von Storch, H., Gualdi, S., 2013. A long-term climatology of medicanes. *Clim Dyn* 43:1183-1195. DOI 10.1007/s00382-013-1893-7.
- Gaertner, M.A., González-Alemán, J.J. et al., 2016. Simulation of medicane over the Mediterranean Sea in a regional climate model ensemble: impact of ocean-atmosphere coupling and increased resolution. *Climate Dynamics*, <http://dx.doi.org/10.1007/s00382-016-3456-1>
- Hart, R. E., 2003. A cyclone phase space derived from thermal wind and thermal asymmetry. *Monthly Weather Review*, 131(4), 585-616.
- Miglietta, M. M., Laviola, S., Malvaldi, A., Conte, D., Levizzani, V., & Price, C., 2013. Analysis of tropical-like cyclones over the Mediterranean Sea through a combined modeling and satellite approach. *Geophysical Research Letters*, 40(10), 2400-2405.

Picornell, M. A., Jansa, A., Genovés, A., & Campins, J. (2001). Automated database of mesocyclones from the HIRLAM (INM)- 0.5° analyses in the western Mediterranean. International Journal of Climatology, 21(3), 335-354.